

BDR

						ケール終了日	
		Day1	Day8	Day15	Day22	Day35	
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠 リツキシマブ投与30分前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠 リツキシマブ投与30分前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠 リツキシマブ投与30分前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠 リツキシマブ投与30分前に内服してください。		
		■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 5瓶 30分点滴 ホルテゾミブ投与前に ホルテゾミブ皮下注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 腹部または大腿部に ゆっくり ヴァーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200mL/hまで 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 5瓶 30分点滴 ホルテゾミブ投与前に ホルテゾミブ皮下注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 腹部または大腿部に ゆっくり ヴァーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200mL/hまで 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 5瓶 30分点滴 ホルテゾミブ投与前に ホルテゾミブ皮下注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 腹部または大腿部に ゆっくり ヴァーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200mL/hまで 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 5瓶 30分点滴 ホルテゾミブ投与前に ホルテゾミブ皮下注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 腹部または大腿部に ゆっくり ヴァーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200mL/hまで 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より		
Bor:1.3mg/m ² d1,8,15,22 リツキシマブ:375mg/m ² d1,8,15,22(投与速度は添付文書の規定に従う) Dex:40mg/body d1,8,15,22							