Aza+Ven(#1)

| | | | | | | | | | クール終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 | Day28 |
| | | | | | | | | | |
| 抗がん剤 | 注射・内服・処置 | ■---【注射】<br>皮下注<br>ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ注射用【化療】<br>注射用水 20mL … 1管<br>調製後1時間以内に投与終了すること<br>調製時2.6mLを超える場合は、ｼﾘﾝｼﾞ2本使用し均等に分けること | ■---【注射】<br>皮下注<br>ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ注射用【化療】<br>注射用水 20mL … 1管<br>調製後1時間以内に投与終了すること<br>調製時2.6mLを超える場合は、ｼﾘﾝｼﾞ2本使用し均等に分けること | ■---【注射】<br>皮下注<br>ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ注射用【化療】<br>注射用水 20mL … 1管<br>調製後1時間以内に投与終了すること<br>調製時2.6mLを超える場合は、ｼﾘﾝｼﾞ2本使用し均等に分けること | ■---【注射】<br>皮下注<br>ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ注射用【化療】<br>注射用水 20mL … 1管<br>調製後1時間以内に投与終了すること<br>調製時2.6mLを超える場合は、ｼﾘﾝｼﾞ2本使用し均等に分けること | ■---【注射】<br>皮下注<br>ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ注射用【化療】<br>注射用水 20mL … 1管<br>調製後1時間以内に投与終了すること<br>調製時2.6mLを超える場合は、ｼﾘﾝｼﾞ2本使用し均等に分けること | ■---【注射】<br>皮下注<br>ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ注射用【化療】<br>注射用水 20mL … 1管<br>調製後1時間以内に投与終了すること<br>調製時2.6mLを超える場合は、ｼﾘﾝｼﾞ2本使用し均等に分けること | ■---【注射】<br>皮下注<br>ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ注射用【化療】<br>注射用水 20mL … 1管<br>調製後1時間以内に投与終了すること<br>調製時2.6mLを超える場合は、ｼﾘﾝｼﾞ2本使用し均等に分けること | |
| | | ■---【処置】<br>外来化学療法関連院内渡し分C … 1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ内服ｾﾞﾘｰ 2mg「ｹﾐﾌｧ」 … 1包 | ■---【処置】<br>外来化学療法関連院内渡し分C … 1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ内服ｾﾞﾘｰ 2mg「ｹﾐﾌｧ」 … 1包 | ■---【処置】<br>外来化学療法関連院内渡し分C … 1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ内服ｾﾞﾘｰ 2mg「ｹﾐﾌｧ」 … 1包 | ■---【処置】<br>外来化学療法関連院内渡し分C … 1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ内服ｾﾞﾘｰ 2mg「ｹﾐﾌｧ」 … 1包 | ■---【処置】<br>外来化学療法関連院内渡し分C … 1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ内服ｾﾞﾘｰ 2mg「ｹﾐﾌｧ」 … 1包 | ■---【処置】<br>外来化学療法関連院内渡し分C … 1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ内服ｾﾞﾘｰ 2mg「ｹﾐﾌｧ」 … 1包 | ■---【処置】<br>外来化学療法関連院内渡し分C … 1<br>ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ内服ｾﾞﾘｰ 2mg「ｹﾐﾌｧ」 … 1包 | |
| | | ■---【投薬】<br>(C)ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀ錠 100mg … 1錠<br>1日 朝 食後<br>1日目<br>主治医の指示確認後に内服してください。<br>1日 | ■---【投薬】<br>(C)ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀ錠 100mg … 2錠<br>1日 朝 食後<br>2日目<br>主治医の指示確認後に内服してください。<br>1日 | ■---【投薬】<br>(C)ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀ錠 100mg … 4錠<br>1日 朝 食後<br>3日目<br>主治医の指示確認後に内服してください。<br>1日 | ■---【投薬】<br>(C)ﾍﾞﾈｸﾚｸｽﾀ錠 100mg … 4錠<br>1日 朝 食後<br>4日目以降<br>25日 | | | | |
| Azacitidine：75mg/㎡ d1-7<br>Venetoclax：100mg d1, 200mg d2, 400mg d3-28<br>28日毎 | | | | | | | | | |