

		Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	クール終了日 Day28		
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】 皮下注…1 ビダージェ注射用【化膿】 注射用水 20mL…1管 調製後1時間以内に投与終了すること 調製時2.6mLを超える場合は、シリンジ2本使用し均等に分けること</p>	<p>■---【注射】 皮下注…1 ビダージェ注射用【化膿】 注射用水 20mL…1管 調製後1時間以内に投与終了すること 調製時2.6mLを超える場合は、シリンジ2本使用し均等に分けること</p>	<p>■---【注射】 皮下注…1 ビダージェ注射用【化膿】 注射用水 20mL…1管 調製後1時間以内に投与終了すること 調製時2.6mLを超える場合は、シリンジ2本使用し均等に分けること</p>	<p>■---【注射】 皮下注…1 ビダージェ注射用【化膿】 注射用水 20mL…1管 調製後1時間以内に投与終了すること 調製時2.6mLを超える場合は、シリンジ2本使用し均等に分けること</p>	<p>■---【注射】 皮下注…1 ビダージェ注射用【化膿】 注射用水 20mL…1管 調製後1時間以内に投与終了すること 調製時2.6mLを超える場合は、シリンジ2本使用し均等に分けること</p>	<p>■---【注射】 皮下注…1 ビダージェ注射用【化膿】 注射用水 20mL…1管 調製後1時間以内に投与終了すること 調製時2.6mLを超える場合は、シリンジ2本使用し均等に分けること</p>	<p>■---【注射】 皮下注…1 ビダージェ注射用【化膿】 注射用水 20mL…1管 調製後1時間以内に投与終了すること 調製時2.6mLを超える場合は、シリンジ2本使用し均等に分けること</p>			
		<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C…1 クラニトD内服ゼリー 2mg/757J…1包</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C…1 クラニトD内服ゼリー 2mg/757J…1包</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C…1 クラニトD内服ゼリー 2mg/757J…1包</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C…1 クラニトD内服ゼリー 2mg/757J…1包</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C…1 クラニトD内服ゼリー 2mg/757J…1包</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C…1 クラニトD内服ゼリー 2mg/757J…1包</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C…1 クラニトD内服ゼリー 2mg/757J…1包</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C…1 クラニトD内服ゼリー 2mg/757J…1包</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C…1 クラニトD内服ゼリー 2mg/757J…1包</p>	
		<p>■---【投薬】 (C)ネネルクス錠 100mg…4錠 1日 朝食後 28日</p>									
Azacitidine: 75mg/m <sup>2</sup> d1-7 Venetoclax: 400mg d1-28 28日毎											