

Pola-BR(2日)

				クール終了日
		Day1	Day2	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200ml/hまで 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 リツキシマブのフラッシュ用 全開で点滴可 側管より パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg「タイホウ」… 1袋 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 ボライビー投与前のフラッシュ用 全開で点滴可 側管より ボライビー点滴静注【化療】 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 (30)分点滴 フィルター付閉鎖式輸液セットを使用 側管より 生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 ボライビー投与後に 側管より トリアキシン点滴静注液【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 (10)分点滴 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 トリアキシンのフラッシュ用 全開で点滴可 側管より	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 側管より トリアキシン点滴静注液【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 (10)分点滴 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコウ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠 リツキシマブ開始30分前に内服		
リツキシマブ:375mg/m ² d1(投与速度は添付文書の規定に従う) Pola:1.8mg/kg d1(投与速度は添付文書の規定に従う) Benda:90mg/m ² d1,2				