nonPhALL MRD2019(C)(36～55y.o.)

												クール終了日
		Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day14	Day15	Day16	Day17	Day18	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■――【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ	■――【注射】 ﾊﾞﾛﾏｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg「ﾀｲﾎｳ … 1袋 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 側管より ｵﾝｺﾋﾞﾝ【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 側管より 9時 ﾒｽﾄﾚｷｾｰﾄ注(200mg･1g用)【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 （0.5）時間点滴 側管より 10時 ﾒｽﾄﾚｷｾｰﾄ注(200mg･1g用)【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 （23.5）時間点滴 側管より 10時30分 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中1本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中2本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中3本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中4本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中5本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中6本目 ﾒｽﾄﾚｷｾｰﾄ(髄注用)【化療】… 15mg ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 3.3mg … 1管 生理食塩液　mL用（注射用）… 2mL	■――【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中1本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中2本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中3本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中4本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中5本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中6本目 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注 3mg… 8管 側管より 22時 生理食塩液 50mL … 1瓶 前日のﾒｽﾄﾚｷｾｰﾄのﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用 100mg … 1瓶 生理食塩液 20mL … 1管 ﾛｲﾅｰｾﾞ投与前に ﾛｲﾅｰｾﾞ【化療】[静注用] 注射用水 20mL … 1管 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 （4）時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 ﾛｲﾅｰｾﾞのﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可	■――【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中1本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中2本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中3本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中4本目 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注 3mg… 8管 4時 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注 3mg… 8管 10時 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注 3mg… 8管 16時	■――【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 4本中1本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 4本中2本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 4本中3本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 4本中4本目 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注 3mg… 8管 4時 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注 3mg… 8管 10時 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注 3mg… 8管 16時	■――【注射】 ﾊﾞﾛﾏｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg「ﾀｲﾎｳ … 1袋 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 1瓶 30分点滴 側管より ｵﾝｺﾋﾞﾝ【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 側管より 9時 ﾒｽﾄﾚｷｾｰﾄ注(200mg･1g用)【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 （0.5）時間点滴 側管より 10時 ﾒｽﾄﾚｷｾｰﾄ注(200mg･1g用)【化療】 生理食塩液 500mL … 1袋 （23.5）時間点滴 側管より 10時30分 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中1本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中2本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中3本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中4本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中5本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中6本目 ﾒｽﾄﾚｷｾｰﾄ(髄注用)【化療】… 15mg ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 3.3mg … 1管 生理食塩液　mL用（注射用）… 2mL	■――【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中1本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中2本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中3本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中4本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中5本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中6本目 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注 3mg… 8管 側管より 22時 生理食塩液 50mL … 1瓶 前日のﾒｽﾄﾚｷｾｰﾄのﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用 100mg … 1瓶 生理食塩液 20mL … 1管 ﾛｲﾅｰｾﾞ投与前に ﾛｲﾅｰｾﾞ【化療】[静注用] 注射用水 20mL … 1管 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 （4）時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 ﾛｲﾅｰｾﾞのﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可	■――【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中1本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中2本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中3本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中4本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中5本目 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 重ｿｰ静注7% 20mL（炭酸水素Na）… 1管 （4）時間点滴 ﾒｲﾝﾙｰﾄ 6本中6本目 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注 3mg… 8管 4時 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注 3mg… 8管 10時 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注 3mg… 8管 16時 ﾛｲｺﾎﾞﾘﾝ注 3mg… 8管 22時	
		■――【投薬】 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 250mg・・・1回 1錠 1日2回 朝・夕 食後 ﾒｽﾄﾚｷｾｰﾄ投与前日の夕食後から内服開始 4日					■――【投薬】 ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ錠 250mg・・・1回 1錠 1日2回 朝・夕 食後 ﾒｽﾄﾚｷｾｰﾄ投与前日の夕食後から内服開始 4日						
VCR:1.3mg/㎡(max2mg) d1,15 MTX:200mg/㎡ + 1800mg/㎡ d1,15 L-ASP:6000U/㎡ d2,16 MIT:15mg/body(IT) d1,15												