

nonPhALL MRD2019(M-1)(36～55y.o.)

		クール終了日
		Day1
		Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 メインルートで投与終了まで オンコビン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 側管より プレドニ注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 側管から ロイナーゼの前に ゆっくり ロイナーゼ【化療】[筋注用] 5%ブドウ糖液 20ml … 1管 ゆっくり
		■---【投薬】 (C)ロイケリン散(100mg/g)【化療】 1日 就寝前 連日内服してください。 28日 (C)メトトレキサート錠 2.5mg【化療】 1日 1回 就寝前 週、指定の日に内服してください。 (月 日)(月 日)(月 日)(月 日) 4日 【5mg】プレドニゾン錠「タケダ」【化療】 1日 1回 朝食後 注射した翌日の朝食後から4日間内服してください。 4日
		6MP:40mg/m ² d1-28 MTX:20mg/m ² d1,8,15,22 PSL:60mg/m ² (Max100mg) d1(iv),d2-5(po) VCR:1.3mg/m ² (Max2mg) d1 L-ASP:6000U/m ² d1