

		Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	クール終了日 Day28		
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスミヌール錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1.5錠 ファミチンOD錠 10mg「テバ」 … 1錠 開始15分以上前に内服 外来化学療法関連院内渡し分 レナテックス錠 4mg … 5錠 開始15分以上前に内服</p> <p>■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 メイnlート サークリサとともに終了</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与前のフラッシュ用 側管から</p> <p>サークリサ点滴静注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) ml/h 1時間点滴 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 要専用ルート 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイクロス投与前</p> <p>カイクロス【化療】 注射用水 20mL … 1管 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイクロス投与後のフラッシュ用</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナテックス錠 4mg … 5錠 カイクロス開始30分～4時間前に内服</p> <p>■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイクロス投与前</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用</p> <p>カイクロス【化療】 注射用水 20mL … 1管 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイクロス投与後</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスミヌール錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1.5錠 ファミチンOD錠 10mg「テバ」 … 1錠 開始15分以上前に内服 外来化学療法関連院内渡し分 レナテックス錠 4mg … 5錠 開始15分以上前に内服</p> <p>■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 メイnlート サークリサとともに終了</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与前のフラッシュ用 側管から</p> <p>サークリサ点滴静注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) ml/h 1時間点滴 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 要専用ルート 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイクロス投与前</p> <p>カイクロス【化療】 注射用水PL「フー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイクロス投与後のフラッシュ用</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナテックス錠 4mg … 5錠 カイクロス開始30分～4時間前に内服</p> <p>■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイクロス投与前</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用</p> <p>カイクロス【化療】 注射用水PL「フー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイクロス投与後</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスミヌール錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1.5錠 ファミチンOD錠 10mg「テバ」 … 1錠 開始15分以上前に内服 外来化学療法関連院内渡し分 レナテックス錠 4mg … 5錠 開始15分以上前に内服</p> <p>■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 メイnlート サークリサとともに終了</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与前のフラッシュ用 側管から</p> <p>サークリサ点滴静注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) ml/h 1時間点滴 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 要専用ルート 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイクロス投与前</p> <p>カイクロス【化療】 注射用水PL「フー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイクロス投与後のフラッシュ用</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナテックス錠 4mg … 5錠 カイクロス開始30分～4時間前に内服</p> <p>■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイクロス投与前</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用</p> <p>カイクロス【化療】 注射用水PL「フー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイクロス投与後</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスミヌール錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1.5錠 ファミチンOD錠 10mg「テバ」 … 1錠 開始15分以上前に内服 外来化学療法関連院内渡し分 レナテックス錠 4mg … 5錠 開始15分以上前に内服</p> <p>■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 メイnlート サークリサとともに終了</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与前のフラッシュ用 側管から</p> <p>サークリサ点滴静注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) ml/h 1時間点滴 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 要専用ルート 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイクロス投与前</p> <p>カイクロス【化療】 注射用水PL「フー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイクロス投与後のフラッシュ用</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナテックス錠 4mg … 5錠 カイクロス開始30分～4時間前に内服</p> <p>■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイクロス投与前</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用</p> <p>カイクロス【化療】 注射用水PL「フー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイクロス投与後</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスミヌール錠 10mg … 5錠 カロナール錠 500mg … 1.5錠 ファミチンOD錠 10mg「テバ」 … 1錠 開始15分以上前に内服 外来化学療法関連院内渡し分 レナテックス錠 4mg … 5錠 開始15分以上前に内服</p> <p>■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 メイnlート サークリサとともに終了</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与前のフラッシュ用 側管から</p> <p>サークリサ点滴静注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) ml/h 1時間点滴 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 要専用ルート 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 サークリサ投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 側管から</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイクロス投与前</p> <p>カイクロス【化療】 注射用水PL「フー」 100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイクロス投与後のフラッシュ用</p>	<p>■---【投薬】 レナテックス錠 4mg … 1回 5錠 1日 朝食後 day23の朝食後に内服してください。 (月 日)</p>
	Isa:10mg/kg d1.8.15.22(時間は添付文書の規定に従う) KYP:20mg/m ² d1.2.58mg/m ² d8.9.15.16 Dex:40mg/body d1.2.8.9.15.16.22.23										