

DKd(#1)(SC)

									クール終了日
		Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	Day28
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスミンコウ錠 10mg … 5錠 カロール錠 500mg … 1.5錠 レナテックス錠 4mg … 5錠 グラキューロ投与1時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナテックス錠 4mg … 5錠 カイロリス投与30分～4時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスミンコウ錠 10mg … 5錠 カロール錠 500mg … 1.5錠 レナテックス錠 4mg … 5錠 グラキューロ投与1時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナテックス錠 4mg … 5錠 カイロリス投与30分～4時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスミンコウ錠 10mg … 5錠 カロール錠 500mg … 1.5錠 レナテックス錠 4mg … 5錠 グラキューロ投与1時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レナテックス錠 4mg … 5錠 カイロリス投与30分～4時間前に内服してください。	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスミンコウ錠 10mg … 5錠 カロール錠 500mg … 1.5錠 レナテックス錠 4mg … 10錠 グラキューロ投与1時間前に内服してください。	
		■---【注射】 グラキューロ配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与前に 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与前のフライング用 全開で点滴可 カイロリス【化療】 注射用水 20mL … 1管 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与後に	■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与前に 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与前のフライング用 全開で点滴可 カイロリス【化療】 注射用水 20mL … 1管 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与後に	■---【注射】 グラキューロ配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与前に 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与前のフライング用 全開で点滴可 カイロリス【化療】 注射用水PL【フー】100mL … 1瓶 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与後に	■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与前に 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与前のフライング用 全開で点滴可 カイロリス【化療】 注射用水PL【フー】100mL … 1瓶 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与後に	■---【注射】 グラキューロ配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与前に 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与前のフライング用 全開で点滴可 カイロリス【化療】 注射用水PL【フー】100mL … 1瓶 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与後に	■---【注射】 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与前に 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与前のフライング用 全開で点滴可 カイロリス【化療】 注射用水PL【フー】100mL … 1瓶 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与後に	■---【注射】 グラキューロ配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与前に 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与前のフライング用 全開で点滴可 カイロリス【化療】 注射用水PL【フー】100mL … 1瓶 5% ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 カイロリス投与後のフラッシュ用 全開で点滴可 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 カイロリス投与後に	
Dara(SC):1800mg/body d1,8,15,22 KYP:20mg/㎡ d1,2 56mg/㎡ d8,9,15,16 Dex:20mg/body d1,2,8,9,15,16 40mg/body d22(76歳以上は20mg/週に減量)									