

DKd(#7以降)(SC)

		Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	クール終了日 Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レチデックス錠 10mg … 5錠 カロニル錠 500mg … 1.5錠 レチデックス錠 4mg … 5錠 タラキューロ投与1時間前に内服してください。</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レチデックス錠 4mg … 5錠 カイロロス投与30分～4時間前に内服してください。</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レチデックス錠 4mg … 5錠 カイロロス投与30分～4時間前に内服してください。</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レチデックス錠 4mg … 5錠 カイロロス投与30分～4時間前に内服してください。</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レチデックス錠 4mg … 5錠 カイロロス投与30分～4時間前に内服してください。</p>	<p>■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レチデックス錠 4mg … 5錠 カイロロス投与30分～4時間前に内服してください。</p>	
		<p>■---【注射】 皮下注 タラキューロ配合皮下注【化療】… 1800mg 3～5分かけて 腹部に</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フライシグ用 全開で点滴可</p> <p>カイロロス【化療】 注射用水PL【フー-J】100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライシグ用 全開で点滴可</p> <p>カイロロス【化療】 注射用水PL【フー-J】100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライシグ用 全開で点滴可</p> <p>カイロロス【化療】 注射用水PL【フー-J】100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライシグ用 全開で点滴可</p> <p>カイロロス【化療】 注射用水PL【フー-J】100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライシグ用 全開で点滴可</p> <p>カイロロス【化療】 注射用水PL【フー-J】100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライシグ用 全開で点滴可</p> <p>カイロロス【化療】 注射用水PL【フー-J】100mL … 1瓶 5%ブドウ糖液 100mL … 1瓶 30分点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【投薬】 レチデックス錠 4mg … 1回 10錠 1日 朝食後 day22の朝食後に内服してください。 (月 日)</p>
Dara(SC):1800mg/body d1 KYF:56mg/m ² d1,2,8,9,15,16 Dex:20mg/body d1,2,8,9,15,16 40mg/body d22(76歳以上は20mg/週に減量)								