SMILE

		Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day8	Day10	Day12	Day14	Day16	Day18	Day20	クール終了日 Day28
抗がん剤	注射・内服・筋注	■一【注射】 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ	■一【注射】 ﾊﾟﾛﾉｾｴﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸ0.75mg/ﾀｲｵﾛｰ ･･･ 1袋 ﾄﾞｾﾀｰﾙ注射液 6.6mg ･･･ 1瓶 30分点滴 側管より ﾒﾄﾛﾚｷｰﾄ注200mg-1g用【化療】 生理食塩液 500mL ･･･ 1袋 (6)時間点滴 側管より 10時 生理食塩液 50mL ･･･ 1瓶 ﾒﾄﾛﾚｷｰﾄ投与後のﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 側管より ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中1本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中2本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中3本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中4本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中5本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中6本目 ﾄﾛｺﾞﾝ注 3mg･･･ 5管 16時 ﾄﾛｺﾞﾝ注 3mg･･･ 5管 22時 生理食塩液 100mL ･･･ 1瓶 ﾄﾞｾﾀｰﾙ注射液 6.6mg ･･･ 5瓶 30分点滴 側管より ｲﾒｷｲﾄﾞ【化療】 生理食塩液 500mL ･･･ 1袋 (2)時間点滴 側管より ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 400mg ･･･ 1.5管 ゆっくり 1日1回の1本目 ｲﾒｷｲﾄﾞ開始後 側管より ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 400mg ･･･ 1.5管 ゆっくり 1日1回の2本目 ｲﾒｷｲﾄﾞ開始後4時間 側管より ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 400mg ･･･ 1.5管 ゆっくり 1日1回の3本目 ｲﾒｷｲﾄﾞ開始後8時間 側管より ｴﾄﾎｼﾄﾞ注【化療】 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾌｧｰ」500mL ･･･ 1袋 (2)時間点滴 側管より 生理食塩液 50mL ･･･ 1瓶 ｴﾄﾎｼﾄﾞ投与後のﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 側管より	■一【注射】 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中1本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中2本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中3本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中4本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中5本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中6本目 ﾄﾛｺﾞﾝ注 3mg･･･ 5管 4時 ﾄﾛｺﾞﾝ注 3mg･･･ 5管 10時 ﾄﾛｺﾞﾝ注 3mg･･･ 5管 16時 ﾄﾛｺﾞﾝ注 3mg･･･ 5管 22時 生理食塩液 100mL ･･･ 1瓶 ﾄﾞｾﾀｰﾙ注射液 6.6mg ･･･ 5瓶 30分点滴 側管より ｲﾒｷｲﾄﾞ【化療】 生理食塩液 500mL ･･･ 1袋 (2)時間点滴 側管より ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 400mg ･･･ 1.5管 ゆっくり 1日1回の1本目 ｲﾒｷｲﾄﾞ開始後 側管より ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 400mg ･･･ 1.5管 ゆっくり 1日1回の2本目 ｲﾒｷｲﾄﾞ開始後4時間 側管より ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 400mg ･･･ 1.5管 ゆっくり 1日1回の3本目 ｲﾒｷｲﾄﾞ開始後8時間 側管より ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 400mg ･･･ 1.5管 ゆっくり 1日1回の4本目 ｲﾒｷｲﾄﾞ開始後12時間 側管より ｴﾄﾎｼﾄﾞ注【化療】 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾌｧｰ」500mL ･･･ 1袋 (2)時間点滴 側管より 生理食塩液 50mL ･･･ 1瓶 ｴﾄﾎｼﾄﾞ投与後のﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 側管より	■一【注射】 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中1本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中2本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中3本目 ｿﾙﾃﾞｽﾑA　500mL ･･･ 1袋 重ﾌｰ静注7% 20mL (炭酸水素Na) ･･･ 1管 (4)時間点滴 ﾒｲﾝｺｰﾄ 6本中4本目 ﾄﾛｺﾞﾝ注 3mg･･･ 5管 4時 ﾄﾛｺﾞﾝ注 3mg･･･ 5管 10時 生理食塩液 100mL ･･･ 1瓶 ﾄﾞｾﾀｰﾙ注射液 6.6mg ･･･ 5瓶 30分点滴 側管より ｲﾒｷｲﾄﾞ【化療】 生理食塩液 500mL ･･･ 1袋 (2)時間点滴 側管より ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 400mg ･･･ 1.5管 ゆっくり 1日1回の1本目 ｲﾒｷｲﾄﾞ開始後 側管より ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 400mg ･･･ 1.5管 ゆっくり 1日1回の2本目 ｲﾒｷｲﾄﾞ開始後4時間 側管より ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 400mg ･･･ 1.5管 ゆっくり 1日1回の3本目 ｲﾒｷｲﾄﾞ開始後8時間 側管より ｴﾄﾎｼﾄﾞ注【化療】 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾌｧｰ」500mL ･･･ 1袋 (2)時間点滴 側管より 生理食塩液 50mL ･･･ 1瓶 ｴﾄﾎｼﾄﾞ投与後のﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 側管より	■一【注射】 皮内注射 ･･ 1 注射用水 20mL ･･･ 1管 生理食塩液 20mL ･･ 1管 皮内反応試験用 5% ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナー才【化療】[静注用] 注射用水 20mL ･･･ 1管 5% ブドウ糖注ﾊﾞｯｸﾌｧｰ」500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■一【注射】 5% ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナー才【化療】[静注用] 注射用水 20mL ･･･ 1管 5% ブドウ糖注ﾊﾞｯｸﾌｧｰ」500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■一【注射】 5% ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナー才【化療】[静注用] 注射用水 20mL ･･･ 1管 5% ブドウ糖注ﾊﾞｯｸﾌｧｰ」500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■一【注射】 5% ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナー才【化療】[静注用] 注射用水 20mL ･･･ 1管 5% ブドウ糖注ﾊﾞｯｸﾌｧｰ」500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■一【注射】 5% ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナー才【化療】[静注用] 注射用水 20mL ･･･ 1管 5% ブドウ糖注ﾊﾞｯｸﾌｧｰ」500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■一【注射】 5% ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 プライミング用 ロイナー才【化療】[静注用] 注射用水 20mL ･･･ 1管 5% ブドウ糖注ﾊﾞｯｸﾌｧｰ」500mL ･･･ 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液　50mL ･･･ 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	
		■一【投薬】 ﾀｲﾚｱｯｸｽ錠 250mg･･･1回 1錠 1日2回 朝・夕 食後 ﾒﾄﾛﾚｷｰﾄ投与前日の夕食後から内服開始 4日												

MTX:2000mg/ m² d1
IFM:1500mg/ m² d2~4
ETP:100mg/ m² d2~4
L-ASP:6000U/ m² d8,10,12,14,16,18,20