

		クール終了日
		Day1
		Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【処置】</p> <p>レスタミンコ-ワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠 リツキシマフ投与30分前に内服してください。</p>
		<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プレドニン[水溶性]50mg … 2管 リツキシマフ投与前に 側管より</p> <p>リツキシマフBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200ml/hまで 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 リツキシマフ投与後に 側管より</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」 … 1袋 (30)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 ホライビ-投与前に 側管より</p> <p>ホライビ-点滴静注【化療】 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 100mL … 1瓶 (90)分点滴 側管より フィルター付閉鎖式輸液セットを使用</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 30分点滴 ホライビ-投与後に 側管より</p> <p>トキシルビン塩酸塩注【化療】 生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 トキシルビン投与後に 側管より</p> <p>エンドキサン注【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 (60)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 エンドキサン投与後に 側管より</p> <p>■---【投薬】</p> <p>【5mg】プレドニゾン錠「タケダ」 … 20錠 1日 1回 朝食後 点滴の翌日から必ず4日間服用してください。 4日</p>
<p>Pola:1.8mg/kg d1 R:375mg/m² d1 PSL:100mg/body d1(iv), d2-5(p.o.) DXR:50mg/m² d1 CPA:750mg/m² d1 21日毎 投与速度は各薬剤の規定に従う</p>		