

R-CHOP(同日)

			クール終了日
		Day1	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	■――【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソブ ロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠	
		■――【注射】 グーイーF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで 生理食塩液 20mL … 1管 プレドニン〔水溶性〕50mg … 2管 リツキシマブ 投与前に 側管より リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200ml/hまで 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 リツキシマブの後に 側管より グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg「HK」 … 1袋 (30)分点滴 側管より 生理食塩液 20mL … 1管 オンゴビン【化療】 ゆっくり 禁血管外漏出 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 ドキシルビシン塩酸塩注【化療】 全開で点滴可 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 ドキシルビシンの後に 側管より 生理食塩液 250mL … 1袋 エンドキサン注【化療】 (60)分点滴 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 エンドキサンの後に 側管より	
		■――【投薬】 【5mg】プレドニゾン錠「タケダ」・・・1回 20錠 1日 1回 朝食後 点滴の翌日から必ず4日間服用してください。	
		リツキシマブ:375mg/㎡ d1(時間は添付文書の規定に従う) VCR:1.4mg/㎡ d1 DXR:50mg/㎡ d1 CPA:750mg/㎡ d1 PSL(静注):100mg/body d1 PSL(内服):100mg/body d2-5	