

R-CHOP(同日)

		クール終了日
		Day1
		Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスチノール錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠</p> <p>■---【注射】</p> <p>グイーンF輸液 500mL … 1袋 メインレートを点滴終了まで</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プレドニル(水溶性)50mg … 2管 リツキシマブ投与前に 側管より</p> <p>リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25mL/hずつ上げる 最大200ml/hまで 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 リツキシマブの後に 側管より</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg「HKJ」… 1袋 (30)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 オンコピン【化療】 ゆっくり 禁血管外漏出 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 ドキルビシリン塩酸塩注【化療】 全開で点滴可 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 ドキルビシリンの後に 側管より</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 エドキシ注【化療】 (60)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 エドキシンの後に 側管より</p> <p>■---【投薬】</p> <p>【5mg】プレドニロン錠「タケダ」… 1回 20錠 1日 1回 朝食後 点滴の翌日から必ず4日間服用してください。</p>
リツキシマブ:375mg/m ² d1(時間は添付文書の規定に従う) VCR:1.4mg/m ² d1 DXR:50mg/m ² d1 CPA:750mg/m ² d1 PSL(静注):100mg/body d1 PSL(内服):100mg/body d2-5		