

CHOP

		クール終了日
		Day1
		Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【投薬】 プレドニゾン錠(5mg) … 20錠 1日 朝 食後 点滴の翌日から必ず4日間服用してください。
		■---【注射】 ソリューゲンF注 500mL … 1瓶 (2)時間点滴 メインルートで点滴終了まで グラセトン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」 … 1袋 プレドニン〔水溶性〕50mg … 2管 生理食塩液 5mL(溶解用) … 1管 (30)分点滴 側管より 生理食塩液 20mL … 1管 オンコビン【化療】 ゆっくり 禁血管外漏出 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 ドキソビルシン塩酸塩注【化療】 全開で点滴可 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 ドキソビルシン投与後 側管より 生理食塩液 250mL … 1瓶 エンドキサン注【化療】 (60)分点滴 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 エンドキサン投与後 側管より
VCR:1.4mg/m ² d1 DXR:50mg/m ² d1 CPA:750mg/m ² d1 PSL:100mg/body(静注) d1 PSL:100mg/body(内服) d2-5		