

		クール終了日
		Day1
		Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>ソリューゲンF注 500mL … 1瓶 (2)時間点滴 メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」 … 1袋 プレドニン〔水溶性〕50mg … 2管 生理食塩液 5mL(溶解用) … 1管 (30)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 オンコピン【化療】 ゆっくり 禁血管外漏出 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 テラルビシン【化療】 全開で点滴可 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 テラルビシン投与後 側管より</p> <p>生理食塩液 250mL … 1瓶 エントキサン注【化療】 (60)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 エントキサン投与後 側管より</p>
		<p>■---【投薬】</p> <p>プレドニゾン錠(5mg) … 20錠 1日 朝食後 点滴の翌日から必ず4日間服用してください</p>
<p>VCR:1.4mg/m² d1 THP:40~50mg/m² d1 CPA:750mg/m² d1 PSL(静注):100mg/body d1 PSL(内服):100mg/body d2-5</p>		