

R-CHOP(2日で)

				クール終了日
		Day1	Day2	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>ウーイーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200ml/hまで 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ウーイーンF輸液 500mL … 1袋 (2)時間点滴 メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラセトロン点滴静注バッグ 3mg[HK] … 1袋 フレドニン[水溶性]50mg … 2管 生理食塩液 5mL(溶解用) … 1管 (30)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 オンコピン【化療】 ゆっくり 禁血管外漏出 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 ドキシルビシン塩酸塩注【化療】 全開で点滴可 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 ドキシルビシン投与後 側管より</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 エンドキサン注【化療】 (60)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 エンドキサン投与後 側管より</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコウ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>【5mg】フレドニゾロン錠「タケダ」…1回 20錠 1日 1回 朝食後 点滴の翌日から必ず4日間服用してください。</p>	
		<p>リツキシマブ:375mg/m² d1(時間は添付文書の規定に従う) VCR:1.4mg/m² d2 DXR:50mg/m² d2 CPA:750mg/m² d2 PSL(静注):100mg/body d2 PSL(内服):100mg/body d3-6</p>		