

R-THP-COP(2日で)

				クール終了日
		Day1	Day2	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠	■---【投薬】 【5mg】プレドニゾン錠「タケダ」…1回 20錠 1日 1回 朝食後 点滴の翌日から必ず4日間服用してください。	
		■---【注射】 ウィーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで リツキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200ml/hまで 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より	■---【注射】 ウィーンF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで グラニセロン点滴静注パック 3mg「HK」… 1袋 プレドニン[水溶性]50mg … 2管 生理食塩液 5mL(溶解用) … 1管 (30)分点滴 側管より 生理食塩液 20mL … 1管 オンコビン【化療】 ゆっくり 禁血管外漏出 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 テラルビシン【化療】 全開で点滴可 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 テラルビシン投与後 側管より 生理食塩液 250mL … 1袋 エンドキサン注【化療】 (60)分点滴 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 エンドキサン投与後 側管より	
リツキシマブ:375mg/m ² d1(時間は添付文書の規定に従う) VCR:1.4mg/m ² d2 THP:40～50mg/m ² d2 CPA:750mg/m ² d2 PSL(静注):100mg/body d2 PSL(内服):100mg/body d3～6				