

R-THP-COP(同日)

		クール終了日	
		Day1	Day21
		<p>■【投薬】 [5mg]「アドニコ」錠「タケダ」…1回 20錠 1日 1回 朝 食後 点滴の翌日から必ず4日間服用してください。</p> <p>■【注射】 ワイング輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで 生理食塩液 20mL … 1管 ブレーゼン(水溶性)150mg … 2管 リキシマブ投与前に 側管より リキシマブBS注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 25 mL/h (30)分点滴 50 mL/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200mL/hまで 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 リキシマブ投与後 側管より ケラセロン点滴静注バッグ 3mg「HK」 … 1袋 側管より 生理食塩液 20mL … 1管 オロビン【化療】 ゆっくり 禁血管外漏出 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 テラビシン【化療】 全開で点滴可 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 テラビシン投与後 側管より 生理食塩液 250mL … 1袋 エドキサザン注【化療】 (60)分点滴 側管より 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 エドキサザン投与後 側管より</p> <p>■【処置】 外来化学療法間連院内渡し分 レスチシヨウ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠</p>	
抗がん剤	注射・内服・処置		
		リツキシマブ:375mg/m ² d1(時間は添付文書の規定に従う) VCR:1.4mg/m ² d1 THP:40~50mg/m ² d1 CPA:750mg/m ² d1 PSL(静注):100mg/body d1 PSL(内服):100mg/body d2~5	