

		Day1	Day8	Day15	Day22	クール終了日 Day35
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1            レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠            ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠            リツキシマブ投与30分前に内服してください。</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1            レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠            ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠            リツキシマブ投与30分前に内服してください。</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1            レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠            ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠            リツキシマブ投与30分前に内服してください。</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分C … 1            レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠            ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠            リツキシマブ投与30分前に内服してください。</p>	
		<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶            テキサート注射液 6.6mg … 5瓶            30分点滴            ヘルケイト投与前に</p> <p>皮下注 … 1            ヘルケイト皮下注【化療】            生理食塩液 20mL … 1管            腹部または大腿部に            ゆっくり</p> <p>ソリューケンF注 500mL … 1袋            メインルートで点滴終了まで</p> <p>リツキシマブ注【化療】            生理食塩液 mL用(希釈専用)            50 ml/h            (30)分点滴            100 ml/h            (30)分点滴            以降、30分毎に(50)mL/hずつ上げる            最大400mL/hまで</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶            フラッシュ用            全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶            テキサート注射液 6.6mg … 5瓶            30分点滴            ヘルケイト投与前に</p> <p>皮下注 … 1            ヘルケイト皮下注【化療】            生理食塩液 20mL … 1管            腹部または大腿部に            ゆっくり</p> <p>ソリューケンF注 500mL … 1袋            メインルートで点滴終了まで</p> <p>リツキシマブ注【化療】            生理食塩液 mL用(希釈専用)            50 ml/h            (30)分点滴            100 ml/h            (30)分点滴            以降、30分毎に(50)mL/hずつ上げる            最大400mL/hまで</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶            フラッシュ用            全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶            テキサート注射液 6.6mg … 5瓶            30分点滴            ヘルケイト投与前に</p> <p>皮下注 … 1            ヘルケイト皮下注【化療】            生理食塩液 20mL … 1管            腹部または大腿部に            ゆっくり</p> <p>ソリューケンF注 500mL … 1袋            メインルートで点滴終了まで</p> <p>リツキシマブ注【化療】            生理食塩液 mL用(希釈専用)            50 ml/h            (30)分点滴            100 ml/h            (30)分点滴            以降、30分毎に(50)mL/hずつ上げる            最大400mL/hまで</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶            フラッシュ用            全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶            テキサート注射液 6.6mg … 5瓶            30分点滴            ヘルケイト投与前に</p> <p>皮下注 … 1            ヘルケイト皮下注【化療】            生理食塩液 20mL … 1管            腹部または大腿部に            ゆっくり</p> <p>ソリューケンF注 500mL … 1袋            メインルートで点滴終了まで</p> <p>リツキシマブ注【化療】            生理食塩液 mL用(希釈専用)            50 ml/h            (30)分点滴            100 ml/h            (30)分点滴            以降、30分毎に(50)mL/hずつ上げる            最大400mL/hまで</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶            フラッシュ用            全開で点滴可</p>	
<p>Bor:1.3mg/m<sup>2</sup> d1,8,15,22            リツキシマブ:375mg/m<sup>2</sup> d1,8,15,22            Dex:40mg/body d1,8,15,22            35日毎</p>						