								クール
	Dayl	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	Day28
	■ 【処置】 外来化学療法関連除内液し分 レスをシュー7錠 10mg … 5錠 カロナール錠 900mg … 1.5錠 レナデッス炎 4mg … 5錠 ダッキューロ投与1時間前に内服してください。	■【処置】 外来化学療法関連除内護し分 レナデクス度 4ng・・・5錠 かイフロス投与30分~4時間前に内服してください。	■ - 【処理】 外来化学療法関連院内達し分 レスを2つ一9錠 10mg · ・ 5錠 カロナル錠 500mg · ・ 1.5錠 レナデラス錠 4mg · ・ 3錠 ダッキュー0投与1時間前に内服してください。	外来化学療法関連院内渡し分 レナデックス錠 4mg ··· 5錠 カイプロJス役与30分~4時間前に内服してください。	■―【処置】 外来化学療法関連院内護し分 レスタシュー策(10mg ·· 5歳 カポール数 200mg ·· 15歳 レナックス錠 4mg ·· 5歳 ジラキュー収分 1時間前に内服してください。	■【処置】 外来で宇衛法関連股内進し分 レナラウス後 4mg ・・5歳 カイフロリス投与30分~4時間前に内服してください。	■ [処置] 外来化学療法関連院内渡し分 レスをシューラ版 10mg … 5錠 カローム版 500mg … 1.5版 レナックス級 4mg … 10版 ダラキューロ投与1時間前に内服してください。	
	■[注射]	■【注射】	■[注射]	■[注射]	■【注射】	■[注射]	■[注射]	
	皮下注 f [*] /*2-ロ配合皮下注[化療] 3~5分かけて 腹部に	生理食塩液 250mL…1装 1時間点滴 カイプリス投与前に 596.7 ドク酸液 50ml…1転	皮下注 ダラキューロ配合皮下注【化療】 3~5分かけて 腹部に	1時間点滴 かプロス投与前に	皮下注 97年ューロ配合皮下注【化療】 3~5分かけて 腹節	生理食塩液 250mL…1袋 1時間点消 カイロル及与約に 5% 2ドウ酵液 50ml…1年	皮下注 9'9キュー印配合皮下注【化療】 3~5分かけて 酸制に	
がん剤 注射・内服・分	生理食塩液 250mL…1袋 1時間点滴 カイフロリス投与前に	3%ラアル網点 のいにいい 族 かイアリス投与前のアライミング 用 全関で点滴可 かイアリス【化療】	生理食塩液 250mL…1袋 1時間点滴 か(7回)X役与前に	かりついる役与前のアライシグ用 全間で点滴可	生理食塩液 250mL…1袋 1時間点滴 かけ7以及与前に	かカノアイを成る GORL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	処置 カイフロリス投与前のフライミが用 全関で点項可	注射用水 20mL ··· 1管 5% 7 F 7 m液 100mL ··· 1瓶 30分点滴	596 ブドウ糖液 50mL···1瓶 カイブリス投与前のブライミッグ用 全関で点消可	注射用水PL「7ツ-」100mL…1瓶	596 ブドウ糖液 50mL…1瓶 カイフロリス投与前のフライミング 用 全開で点消可	注射用水PL[77-] 100mL…1瓶 5% アドウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴		
	カイプロリス【化療】 注射用水 20mL ··· 1管 596 プドウ糖液 100mL···1瓶 30分点滴	596 7 ドウ糖液 50mL・・・1 孫 かイプロス投与後のフラッシュ用 金開で点滴可	か(プロ)ス[化療] 注射用水PL[プリー] 100mL…1瓶 596 ブドウ精液 100mL…1瓶 30分点滴	かプロリス投与後のアラッシュ用 全間で点滴可	た(アロ)ス[化療] 注射用水PL[フツー] 100mL…1瓶 596 アドウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴	5% 7ドウ糖液 50mL…1茲 カイプロリス段与後のフラッシュ用 金関で点滴可		
	5% ブドウ糖液 50mL・・・1瓶 かつコリス投与後のフラッシュ用 全間で点滴可	生理食塩液 250mL…1装 1時間点滴 か行で以投与後に	596 ブドウ糖液 50mL…1瓶 カイブロス投与後のフラッシュ用 全関で点滴可	かび切れ役与後に	596 ブドウ糖液 50mL…1瓶 カイブロリス投与後のフラッシュ用 全関で点消可	生理食塩液 250mL・・・1 接 1時間点消 カイプロス投与後に		
	生理食塩液 250mL…1装 1時間点滴 カイフロリス投与後に		生理食塩液 250mL…1装 1時間点滴 か(7回)X投与後に		生理食塩液 250mL…1装 1時間点滴 かけ7吋以投与後に			