DKd(d2)(SC)

									クール終了日
		Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■――【処置】 外来化学療法開連院内渡し分 レスキンコーワ錠 10mg ･･･ 5錠 カロナール錠 500mg･･･1.5錠 レナデックス錠 4mg ･･･ 5錠 ダラキューロ投与1時間前に内服してください。	■――【処置】 外来化学療法開連院内渡し分 レナデックス錠 4mg ･･･ 5錠 カイプロリス投与30分～4時間前に内服してください。	■――【処置】 外来化学療法開連院内渡し分 レスキンコーワ錠 10mg ･･･ 5錠 カロナール錠 500mg･･･1.5錠 レナデックス錠 4mg ･･･ 5錠 ダラキューロ投与1時間前に内服してください。	■――【処置】 外来化学療法開連院内渡し分 レナデックス錠 4mg ･･･ 5錠 カイプロリス投与30分～4時間前に内服してください。	■――【処置】 外来化学療法開連院内渡し分 レスキンコーワ錠 10mg･･･ 5錠 カロナール錠 500mg･･･1.5錠 レナデックス錠 4mg ･･･ 5錠 ダラキューロ投与1時間前に内服してください。	■――【処置】 外来化学療法開連院内渡し分 レナデックス錠 4mg ･･･ 5錠 カイプロリス投与30分～4時間前に内服してください。	■――【処置】 外来化学療法開連院内渡し分 レスキンコーワ錠 10mg･･･ 5錠 カロナール錠 500mg･･･1.5錠 レナデックス錠 4mg･･･10錠 ダラキューロ投与1時間前に内服してください。	
		■――【注射】 皮下注 ダラキューロ配合皮下注【化療】 3～5分かけて 腹部に 5% ブドウ糖液 50mL･･･1瓶 フライシング用 全開で点滴可 カイプロリス【化療】 注射用水PL「ファー」100mL･･･1瓶 5% ブドウ糖液 100mL･･･1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL･･･1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 5% ブドウ糖液 50mL･･･1瓶 フライシング用 全開で点滴可 カイプロリス【化療】 注射用水PL「ファー」100mL･･･1瓶 5% ブドウ糖液 100mL･･･1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL･･･1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 皮下注 ダラキューロ配合皮下注【化療】 3～5分かけて 腹部に 5% ブドウ糖液 50mL･･･1瓶 フライシング用 全開で点滴可 カイプロリス【化療】 注射用水PL「ファー」100mL･･･1瓶 5% ブドウ糖液 100mL･･･1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL･･･1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 5% ブドウ糖液 50mL･･･1瓶 フライシング用 全開で点滴可 カイプロリス【化療】 注射用水PL「ファー」100mL･･･1瓶 5% ブドウ糖液 100mL･･･1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL･･･1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 皮下注 ダラキューロ配合皮下注【化療】 3～5分かけて 腹部に 5% ブドウ糖液 50mL･･･1瓶 フライシング用 全開で点滴可 カイプロリス【化療】 注射用水PL「ファー」100mL･･･1瓶 5% ブドウ糖液 100mL･･･1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL･･･1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 5% ブドウ糖液 50mL･･･1瓶 フライシング用 全開で点滴可 カイプロリス【化療】 注射用水PL「ファー」100mL･･･1瓶 5% ブドウ糖液 100mL･･･1瓶 30分点滴 5% ブドウ糖液 50mL･･･1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 皮下注 ダラキューロ配合皮下注【化療】 3～5分かけて 腹部に	
Dara:1800mg/body d1,8,15,22 KYP:56mg/㎡ d1,2,8,9,15,16 Dex:20mg d1,2,8,9,15,16 40mg d22(76歳以上は20mg/週へ減量）									