

		Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	クール終了日 Day7	
投与4.期	注射・内服・点滴	<p>■---【投与】</p> <p>内服化学療法薬連投内服し分 レチン[®]錠 10mg…5錠 30分～1時間 500mg…15錠 レチン[®]錠 4mg…5錠 9時から10時前までに内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>皮下注 9時から10時前までに皮下注【化療】 3～5分かけて 臍部に 5% フリウ糖液 50mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p> <p>ｶｲﾌﾞﾘﾝ【化療】 注射用水PLﾌﾟﾗｰｼﾞ 100mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p>	<p>■---【投与】</p> <p>内服化学療法薬連投内服し分 レチン[®]錠 4mg…5錠 ｶｲﾌﾞﾘﾝ錠 30分～4時間前までに内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p> <p>ｶｲﾌﾞﾘﾝ【化療】 注射用水PLﾌﾟﾗｰｼﾞ 100mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p>	<p>■---【投与】</p> <p>内服化学療法薬連投内服し分 レチン[®]錠 4mg…5錠 ｶｲﾌﾞﾘﾝ錠 30分～4時間前までに内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p> <p>ｶｲﾌﾞﾘﾝ【化療】 注射用水PLﾌﾟﾗｰｼﾞ 100mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p>	<p>■---【投与】</p> <p>内服化学療法薬連投内服し分 レチン[®]錠 4mg…5錠 ｶｲﾌﾞﾘﾝ錠 30分～4時間前までに内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p> <p>ｶｲﾌﾞﾘﾝ【化療】 注射用水PLﾌﾟﾗｰｼﾞ 100mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p>	<p>■---【投与】</p> <p>内服化学療法薬連投内服し分 レチン[®]錠 10mg…5錠 30分～1時間 500mg…15錠 レチン[®]錠 4mg…5錠 9時から10時前までに内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>皮下注 9時から10時前までに皮下注【化療】 3～5分かけて 臍部に 5% フリウ糖液 50mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p> <p>ｶｲﾌﾞﾘﾝ【化療】 注射用水PLﾌﾟﾗｰｼﾞ 100mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p>	<p>■---【投与】</p> <p>内服化学療法薬連投内服し分 レチン[®]錠 4mg…5錠 ｶｲﾌﾞﾘﾝ錠 30分～4時間前までに内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p> <p>ｶｲﾌﾞﾘﾝ【化療】 注射用水PLﾌﾟﾗｰｼﾞ 100mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 フラシク[®]用 全量で点滴可</p>	<p>■---【投与】</p> <p>内服化学療法薬連投内服し分 レチン[®]錠 4mg…10錠 1日数回 day22の朝食後に内服してください。 (月 日) 1日</p>	
		<p>Day1 1800mg body wt 1.5 KPS 60mg mt wt 2.8, 8.15, 16 Dex 20mg d1, 2, 8, 9, 15, 16 40mg d22 76歳以上は20mg (減量)</p>							