

		Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	ターム終了日 Day21	
抗がん剤	注射・内服・点滴	<p>■---【投薬】</p> <p>内服化学療法経腸内灌洗分 レチナックス錠 10mg…5錠 30分～4錠 500mg…1錠 レチナックス錠 4mg…5錠 9時～10時 投与1時間前に内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>皮下注 9時～10時 配合皮下注【化療】 3～5分かけて 静脈に 5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴 5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴 5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>内服化学療法経腸内灌洗分 レチナックス錠 4mg…5錠 8時～9時 投与30分～4時間前に内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 全量で点滴可 8時～9時【化療】 注射用水PLP(ア) 100mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴 5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 全量で点滴可</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>内服化学療法経腸内灌洗分 レチナックス錠 4mg…5錠 8時～9時 投与30分～4時間前に内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 全量で点滴可 8時～9時【化療】 注射用水PLP(ア) 100mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴 5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 全量で点滴可</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>内服化学療法経腸内灌洗分 レチナックス錠 4mg…5錠 8時～9時 投与30分～4時間前に内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 全量で点滴可 8時～9時【化療】 注射用水PLP(ア) 100mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴 5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 全量で点滴可</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>内服化学療法経腸内灌洗分 レチナックス錠 4mg…5錠 8時～9時 投与30分～4時間前に内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 全量で点滴可 8時～9時【化療】 注射用水PLP(ア) 100mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴 5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 全量で点滴可</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>内服化学療法経腸内灌洗分 レチナックス錠 4mg…5錠 8時～9時 投与30分～4時間前に内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 全量で点滴可 8時～9時【化療】 注射用水PLP(ア) 100mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴 5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 全量で点滴可</p>	<p>■---【投薬】</p> <p>内服化学療法経腸内灌洗分 レチナックス錠 4mg…5錠 8時～9時 投与30分～4時間前に内服してください。</p> <p>■---【注射】</p> <p>5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 全量で点滴可 8時～9時【化療】 注射用水PLP(ア) 100mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 30分点滴 5% フリウ糖液 50mL…1瓶 5% フリウ糖液 100mL…1瓶 全量で点滴可</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>レチナックス錠 4mg…10錠 1日 朝食 day22の朝食後に内服してください。 (月 日) 1日</p>							
		<p>Dara1800mg/body q1 KIP36mg/m² q1,2,3,8,15,16 Dex20mg d1,2,8,9,15,16 40mg d27(6歳以上は20mg/週へ減量)</p>							