

		Day1	Day8	Day15	Day22	クール終了日 Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 フモチン静注 20mg「日新」20mL … 1管 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 15分点滴 EMブリティ投与60分前に開始 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 側管から</p> <p>EMブリティ【化療】 注射用水 100mL … 1瓶 生理食塩液 250mL … 1瓶 30ml/hr 30分点滴 60ml/hr 30分点滴 以後、120ml/hrで点滴 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 側管から</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 フモチン静注 20mg「日新」20mL … 1管 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 15分点滴 EMブリティ投与60分前に開始 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 側管から</p> <p>EMブリティ【化療】 注射用水 100mL … 1瓶 生理食塩液 250mL … 1瓶 30ml/hr 30分点滴 60ml/hr 30分点滴 以後、120ml/hrで点滴 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 側管から</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 フモチン静注 20mg「日新」20mL … 1管 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 15分点滴 EMブリティ投与60分前に開始 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 側管から</p> <p>EMブリティ【化療】 注射用水 100mL … 1瓶 生理食塩液 250mL … 1瓶 30ml/hr 30分点滴 60ml/hr 30分点滴 以後、120ml/hrで点滴 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 側管から</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 フモチン静注 20mg「日新」20mL … 1管 テキサート注射液 6.6mg … 1瓶 15分点滴 EMブリティ投与60分前に開始 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 側管から</p> <p>EMブリティ【化療】 注射用水 100mL … 1瓶 生理食塩液 250mL … 1瓶 30ml/hr 30分点滴 60ml/hr 30分点滴 以後、120ml/hrで点滴 側管から</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 全開で点滴可 側管から</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>(毒・C)ルプラドカブセル 5mg【化療】 … 5C 1日 夕食後 1日目の夕食後から内服開始してください。 3週内服1週休薬</p> <p>レナテックス錠 4mg … 7錠 1日 朝食後 週 EMブリティ点滴当日のみ朝に内服してください。 (月 日)(月 日)(月 日)と次コースの 1日目の朝食後に内服して下さい。</p>				
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコ-7錠 10mg … 5錠 カロナル錠 500mg … 1錠 前投薬開始時に内服してください。</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコ-7錠 10mg … 5錠 カロナル錠 500mg … 1錠 前投薬開始時に内服してください。</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコ-7錠 10mg … 5錠 カロナル錠 500mg … 1錠 前投薬開始時に内服してください。</p>	<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコ-7錠 10mg … 5錠 カロナル錠 500mg … 1錠 前投薬開始時に内服してください。</p>	
<p>エロツズマブ:10mg/kg 1.8,15.22(点滴時間は添付文書の規定に従う) レナリドミド:25mg/body d1-21 Dex:36mg/body(28mg内服+8mg静注) d1.8,15.22</p>						