JALSG ALL202-U Induction therapy(成~)

																			ケール終了日
		Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day8	Day10	Day12	Day14	Day15	Day16	Day18	Day20	Day22	Day28
抗がん剤	注射・内服・局置	■――【注射】 アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 ドキサート注【化療】 1時間点滴 静脈内注射 … 1 オンコン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 緊急管外漏出 ゆっくり ドラビシン【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 1時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 プラシュ用 全開で点滴可 髄注 … 1 メソレキサート髄注用【化療】… 12mg 5ｾﾙﾋﾞﾝ【化療】… 30mg ﾌﾙｰﾅｰﾄ注射用 100mg … 0.25瓶 生理食塩液　mL用（注射用）… 1mL	■――【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 ドキサート注【化療】 1時間点滴 ドラビシン【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 1時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 プラシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 ドキサート注【化療】 1時間点滴 エンドキサン注【化療】 生理食塩液 250mL … 1袋 1時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 プラシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 ドキサート注【化療】 1時間点滴	■――【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 ドキサート注【化療】 1時間点滴	■――【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 ドキサート注【化療】 1時間点滴	■――【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 ドキサート注【化療】 1時間点滴	■――【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 ルート確保用 静脈内注射 … 1 オンコビン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 緊急管外漏出 ゆっくり 皮内注射 … 1 注射用水 20mL … 1管 生理食塩液 20mL … 1管 前回皮内反応試験用 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】[静注用] 注射用水 20mL … 1管 5% ブドウ糖液ハンドﾊﾞｯｸﾞ 500mL … 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プラシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】[静注用] 注射用水 20mL … 1管 5% ブドウ糖液ハンドﾊﾞｯｸﾞ 500mL … 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プラシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】[静注用] 注射用水 20mL … 1管 5% ブドウ糖液ハンドﾊﾞｯｸﾞ 500mL … 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プラシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 ルート確保用 静脈内注射 … 1 オンコビン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 緊急管外漏出 ゆっくり 髄注 … 1 メソレキサート髄注用【化療】… 12mg 5ｾﾙﾋﾞﾝ【化療】… 30mg ﾌﾙｰﾅｰﾄ注射用 100mg … 0.25瓶 生理食塩液　mL用（注射用）… 1mL	■――【注射】 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】[静注用] 注射用水 20mL … 1管 5% ブドウ糖液ハンドﾊﾞｯｸﾞ 500mL … 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プラシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】[静注用] 注射用水 20mL … 1管 5% ブドウ糖液ハンドﾊﾞｯｸﾞ 500mL … 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プラシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】[静注用] 注射用水 20mL … 1管 5% ブドウ糖液ハンドﾊﾞｯｸﾞ 500mL … 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プラシュ用 全開で点滴可	■――【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 ルート確保用 静脈内注射 … 1 オンコビン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 緊急管外漏出 ゆっくり 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プライミング用 ロイナ-ヤ【化療】[静注用] 注射用水 20mL … 1管 5% ブドウ糖液ハンドﾊﾞｯｸﾞ 500mL … 1袋 (4)時間点滴 5% ブドウ糖液 50mL … 1瓶 プラシュ用 全開で点滴可	
		■――【投薬】 アゾレ ｶﾌﾟｾﾙ 125mg[ｻﾜｲ] … 1C 化学療法時(60)分前に 1日	■――【投薬】 アゾレ ｶﾌﾟｾﾙ 125mg[ｻﾜｲ] … 1C 1日 朝 食後 治療開始翌日から2日間内服してください。 2日						■――【投薬】 ﾌｨﾙｺﾞｽﾁﾑ 5mg【化療】 1日 朝 食後 （ 月 日）～（ 月 日） 14日								■――【投薬】 ﾌｨﾙｺﾞｽﾁﾑ 5mg【化療】 … 4錠 1日 朝 食後 治療開始から22日目と23日目に内服してください。 （ 月 日）（ 月 日） 2日 ﾌﾙｺﾝ錠 15mg … 2錠 1日 朝 食後 治療開始から24日目と25日目に内服してください。 （ 月 日）（ 月 日） 2日 ﾌﾙｺﾝ錠 15mg … 1錠 1日 朝 食後 治療開始26日目、27日目、28日目に内服してください。 （ 月 日）（ 月 日）（ 月 日） 3日	
VCR:1.5mg/㎡(Max2mg) d1,8,15,22 THP:25mg/㎡ d1,2 CPA:1200mg/㎡ d3 L-ASP:6000U/㎡ d8,10,12,14,16,18,20,22 MTX(IT):12mg/body d1,15 PSL:60mg/㎡ d8-21(必要漸減) 28日毎																			