

			クール終了日		
			Day28		
		Day1	Day8	Day15	
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【投薬】</p> <p>プレドニ錠 5mg【化療】</p> <p>1日 朝食後</p> <p>治療開始1日目から14日目まで内服してください。</p> <p>(月 日 ~ 月 日)</p> <p>14日</p> <p>プレドニ錠 (5mg) … 4錠</p> <p>1日 朝食後</p> <p>治療開始から15, 16日目に内服してください。</p> <p>(月 日、月 日)</p> <p>2日</p> <p>プレドニ錠 (5mg) … 2錠</p> <p>1日 朝食後</p> <p>治療開始から17, 18日目に内服してください。</p> <p>(月 日、月 日)</p> <p>2日</p> <p>プレドニ錠 (5mg) … 1錠</p> <p>1日 朝食後</p> <p>治療開始から19, 20, 21日目に内服してください。</p> <p>(月 日 ~ 月 日)</p> <p>3日</p>	<p>■---【注射】</p> <p>リューゲン注 500mL … 1袋</p> <p>メインルートで点滴終了まで</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ 3mg【HK】 … 1袋</p> <p>30分点滴</p> <p>静脈内注射 … 1</p> <p>オンピン【化療】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管</p> <p>ゆっくり</p> <p>禁血管外漏出</p> <p>エンドキサン注【化療】</p> <p>生理食塩液 250mL … 1袋</p> <p>1時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶</p> <p>フラッシュ用</p> <p>全開で点滴可</p> <p>筋注 … 1</p> <p>ロイナーゼ【化療】【筋注用】</p> <p>5%ブドウ糖液 20ml … 1管</p> <p>ゆっくり</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶</p> <p>メインルートで点滴終了まで</p> <p>静脈内注射 … 1</p> <p>オンピン【化療】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管</p> <p>ゆっくり</p> <p>禁血管外漏出</p> <p>筋注 … 1</p> <p>ロイナーゼ【化療】【筋注用】</p> <p>5%ブドウ糖液 20ml … 1管</p> <p>ゆっくり</p>	
		<p>VCR:1.5mg/m²(max2mg/body) d1,8,15</p> <p>CPA:600mg/m² d8</p> <p>L-ASP:10000U/m² d1,8,15</p> <p>PSL:40mg/m² d1-14(以降、1週間かけてtepering)</p> <p>28日毎</p>			