

KRd(#2以降)

|   |          | Day1   | Day2   | Day8   | Day9   | Day15  | Day16  | クール終了日<br>Day28                                     |  |
|---|----------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 抗がん剤  | 注射・内服・処置 | <b>■---【注射】</b><br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>カイプロス【化療】<br>注射用水 100mL…1瓶<br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>(10)分点滴<br><br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | <b>■---【注射】</b><br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>カイプロス【化療】<br>注射用水 100mL…1瓶<br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>(10)分点滴<br><br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | <b>■---【注射】</b><br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>カイプロス【化療】<br>注射用水 100mL…1瓶<br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>(10)分点滴<br><br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | <b>■---【注射】</b><br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>カイプロス【化療】<br>注射用水 100mL…1瓶<br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>(10)分点滴<br><br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | <b>■---【注射】</b><br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>カイプロス【化療】<br>注射用水 100mL…1瓶<br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>(10)分点滴<br><br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | <b>■---【注射】</b><br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>カイプロス【化療】<br>注射用水 100mL…1瓶<br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>(10)分点滴<br><br>5%ブドウ糖液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 |   |  |
|   |          | <b>■---【処置】</b><br>外来化学療法関連院内渡し分<br>レナテックス錠 4mg…10錠  |  | <b>■---【処置】</b><br>外来化学療法関連院内渡し分<br>レナテックス錠 4mg…10錠  |  | <b>■---【処置】</b><br>外来化学療法関連院内渡し分<br>レナテックス錠 4mg…10錠  |  | <b>■---【処置】</b><br>外来化学療法関連院内渡し分<br>レナテックス錠 4mg…10錠 |  |
|   |          | <b>■---【投薬】</b><br>(毒)Cルプラミドカプセル 5mg【化療】…5C<br>1日 夕食後<br>1日目の夕食後から内服開始してください。<br>3週内服1週休薬  |  |  |  |  | <b>■---【投薬】</b><br>レナテックス錠 4mg…10錠<br>1日 朝食後<br>22日目に内服してください。<br>(月日)   |   |  |
| カルフィルゾミア:27mg/m <sup>2</sup> d1,2,8,9,15,16(#13以降はd1,2,15,16)<br>レナリドミド:25mg/body d1-21<br>Dex:40mg/body d1,8,15,22 |          |  |  |  |  |  |  |   |  |