

|   |          | クール終了日   |  |
|---|----------|--|--|
|   |          | Day1   |  |
|   |          | Day21  |  |
| 抗がん剤  | 注射・内服・処置 | <p>■---【注射】</p> <p>ソリューゲンF注 500mL … 1瓶<br/>メインルートで点滴終了まで</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管<br/>ブレードン[水溶性]50mg … 2管<br/>リツキシマブ投与前に<br/>側管より</p> <p>リツキシマブ注【化療】<br/>生理食塩液 mL用(希釈専用)<br/>50 ml/h<br/>(30)分点滴<br/>100 ml/h<br/>(30)分点滴<br/>以降、30分毎に(50)mL/hずつ上げる<br/>最大400ml/hまで<br/>側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶<br/>フラッシュ用<br/>リツキシマブの後に<br/>側管より</p> <p>グラネセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」 … 1袋<br/>(30)分点滴<br/>側管より</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管<br/>オンゴピン【化療】<br/>ゆっくり<br/>禁血管外漏出<br/>側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶<br/>ドキシルビシン塩酸塩注【化療】<br/>全開で点滴可<br/>側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶<br/>フラッシュ用<br/>ドキシルビシンの後に<br/>側管より</p> <p>生理食塩液 250mL … 1瓶<br/>エンドキサン注【化療】<br/>(60)分点滴<br/>側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶<br/>フラッシュ用<br/>エンドキサンの後に</p> |  |
|   |          | <p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分<br/>レスタミンコウ錠 10mg … 5錠<br/>ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠</p>  |  |
|   |          | <p>■---【投薬】</p> <p>ブレードン錠 (5mg) … 20錠<br/>1日 朝食後<br/>点滴の翌日から必ず4日間服用してください。</p>   |  |
| <p>リツキシマブ:375mg/m<sup>2</sup> d1(点滴時間は添付文書の規定に従う)<br/>VCR:1.4mg/m<sup>2</sup> d1<br/>DXR:50mg/m<sup>2</sup> d1<br/>CPA:750mg/m<sup>2</sup> d1<br/>PSL(静注):100mg/body d1<br/>PSL(内服):100mg/body d2-5</p> |          |  |  |