R-IDEA

							クール終了日
		Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 ｿﾘｭｰｹﾞﾝF注 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ注【化療】 生理食塩液　mL用(希釈専用) 50 ml/h (30)分点滴 100 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(50)mL/hずつ上げる 最大400ml/hまで 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ終了後ﾌﾗｯｼｭ	■---【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴 ﾌﾛｷｼ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg … 1袋 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 5瓶 (30)分点滴 生理食塩液 500mL … 1袋 ｲﾎﾏｲﾄﾞ【化療】 (2)時間点滴 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管 ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始時 ゆっくり静注 静脈内注射 … 1 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管 ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始後4時間 ゆっくり静注 静脈内注射 … 1 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管 ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始8後時間 ゆっくり静注 静脈内注射 … 1 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　100mL … 1瓶 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注【化療】 (2)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ終了後ﾌﾗｯｼｭ	■---【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 5瓶 (30)分点滴 10時のｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与前 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250mL … 1袋 ｼﾀﾗﾋﾞﾝ【化療】 10時に (1)時間点滴 生理食塩液 500mL … 1袋 ｲﾎﾏｲﾄﾞ【化療】 (2)時間点滴 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管 ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始時 ゆっくり静注 静脈内注射 … 1 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管 ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始後4時間 ゆっくり静注 静脈内注射 … 1 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管 ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始後8時間 ゆっくり静注 静脈内注射 … 1 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　100mL … 1瓶 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注【化療】 (2)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用 100mg … 1瓶 22時のｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与前 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250mL … 1袋 ｼﾀﾗﾋﾞﾝ【化療】 22時に (1)時間 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ終了後ﾌﾗｯｼｭ 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 22時のｼﾀﾗﾋﾞﾝ終了後ﾌﾗｯｼｭ	■---【注射】 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴 ｿﾙﾃﾞﾑ3A　500mL … 1袋 メインルートで (6)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 5瓶 (30)分点滴 10時のｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与前 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250mL … 1袋 ｼﾀﾗﾋﾞﾝ【化療】 10時に (1)時間 生理食塩液 500mL … 1袋 ｲﾎﾏｲﾄﾞ【化療】 (2)時間点滴 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管 ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始時 ゆっくり静注 静脈内注射 … 1 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管 ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始後4時間 ゆっくり静注 静脈内注射 … 1 ｳﾛﾐﾃｷｻﾝ注 400mg … 1管 ｲﾎﾏｲﾄﾞ開始後8時間 ゆっくり静注 静脈内注射 … 1 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｿｰ」 500mL … 1袋 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　100mL … 1瓶 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ注【化療】 (2)時間点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用 100mg … 1瓶 22時のｼﾀﾗﾋﾞﾝ投与前 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖 250mL … 1袋 ｼﾀﾗﾋﾞﾝ【化療】 22時に (1)時間 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ終了後ﾌﾗｯｼｭ 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 22時のｼﾀﾗﾋﾞﾝ終了後ﾌﾗｯｼｭ	■---【注射】 生理食塩液 50mL … 1瓶 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg … 5瓶 (30)分点滴	
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分C … 1 ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ錠 10mg … 5錠 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠 60mg「武田ﾃﾊﾞ」… 1錠 リツキシマブ開始30分前に内服	■---【投薬】 ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ点眼液(0.1%)5mL/本 … 1本 1日(4)回 両眼に点眼 シタラビン点滴終了翌日まで両眼に点眼してください。				

ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ:375mg/㎡ d1　IFM:1300mg/㎡ d2-4
DEXA:39.6mg/body d2-5　VP-16:150mg/㎡ d2-4
Ara-C:750mg*2回/㎡d3-4
21日毎