

|      |          |  |  | クール終了日 |
|------|----------|--|--|--------|
|      |          | Day1   | Day2   | Day21  |
| 抗がん剤 | 注射・内服・処置 | <b>■---【注射】</b><br>ソリューケンF注 500mL … 1瓶<br>メインルートで点滴終了まで<br><br><b>リツキシマブ注【化療】</b><br>生理食塩液 mL用(希釈専用)<br>50 ml/h<br>(30)分点滴<br>100 ml/h<br>(30)分点滴<br>以降、30分毎に(50)mL/hずつ上げる<br>最大400ml/hまで<br>側管より<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可<br>側管より | <b>■---【注射】</b><br>ソリューケンF注 500mL … 1瓶<br>(2)時間点滴<br>メインルートで点滴終了まで<br><br>グラネセロン点滴静注液3mgパツグ「アイロム」 … 1袋<br>プレドニン〔水溶性〕50mg … 2管<br>生理食塩液 5mL(溶解用) … 1管<br>(30)分点滴<br>側管より<br><br>生理食塩液 20mL … 1管<br>オンコピン【化療】<br>側管より<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>テラルピシン【化療】<br>全開で点滴可<br>側管より<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可<br>テラルピシン投与後<br>側管より<br><br>生理食塩液 250mL … 1瓶<br>エントキサン注【化療】<br>(60)分点滴<br>側管より<br><br>生理食塩液 50mL … 1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可<br>エントキサン投与後 |        |
|      |          | <b>■---【処置】</b><br>外来化学療法関連院内渡し分<br>レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠<br>ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠   |  |        |
|      |          |  | <b>■---【投薬】</b><br>プレドニン錠 (5mg) … 20錠<br>1日 朝食後<br>点滴の翌日から必ず4日間服用してください。   |        |
|      |          | リツキシマブ:375mg/m <sup>2</sup> d1(点滴時間は添付文書の規定に従う)<br>VCR:1.4mg/m <sup>2</sup> d2<br>THP:40~50mg/m <sup>2</sup> d2<br>CPA:750mg/m <sup>2</sup> d2<br>PSL(静注):100mg/body d2<br>PSL(内服):100mg/body d3-6   |  |        |