

		クール終了日
		Day1
		Day21
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>リューゲンF注 500mL … 1瓶 (3)時間点滴 メインルートで点滴終了まで</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プレドニ[水溶性]50mg … 2管 リツキシマブ投与前に 側管より</p> <p>リツキシマブ注【化療】 生理食塩液 mL用(希釈専用) 50 ml/h (30)分点滴 100 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(50)mL/hずつ上げる 最大400ml/hまで 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 リツキシマブ投与後 側管より</p> <p>グラネセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」 … 1袋 (30)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 オンコピン【化療】 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 テラルビシン【化療】 全開で点滴可 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 テラルビシン投与後 側管より</p> <p>生理食塩液 250mL … 1瓶 エンドキサン注【化療】 (60)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 エンドキサン投与後 側管より</p> <p>■---【投薬】</p> <p>プレドニ錠 (5mg) … 20錠 1日 朝食後 点滴の翌日から必ず4日間服用してください。</p> <p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 レスチンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」 … 1錠</p>
<p>リツキシマブ:375mg/m<sup>2</sup> d1(点滴時間は添付文書の規定に従う) VCR:1.4mg/m<sup>2</sup> d1 THP:40~50mg/m<sup>2</sup> d1 CPA:750mg/m<sup>2</sup> d1 PSL(静注):100mg/body d1 PSL(内服):100mg/body d2-5</p>		