IsaKd(#1)

									クール終了日
		Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚｽｷﾆｭｰﾛ錠 10mg … 5錠 ｶﾛﾅｰﾙ錠 500mg…1.5錠 ﾌｧﾓﾃｼﾞﾝOD錠 10mg「ﾃﾊ」錠 点滴開始15分以上前に内服 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚﾅﾃｯｸｽ錠 4mg … 5錠 点滴開始15分以上前に内服	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚﾅﾃｯｸｽ錠 4mg … 5錠 ｶｲﾌﾛｽ点滴開始30～4時間前に内服	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚｽｷﾆｭｰﾛ錠 10mg … 5錠 ｶﾛﾅｰﾙ錠 500mg…1.5錠 ﾌｧﾓﾃｼﾞﾝOD錠 10mg「ﾃﾊ」錠 点滴開始15分以上前に内服 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚﾅﾃｯｸｽ錠 4mg … 5錠 点滴開始15分以上前に内服	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚﾅﾃｯｸｽ錠 4mg … 5錠 ｶｲﾌﾛｽ点滴開始30～4時間前に内服	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚｽｷﾆｭｰﾛ錠 10mg … 5錠 ｶﾛﾅｰﾙ錠 500mg…1.5錠 ﾌｧﾓﾃｼﾞﾝOD錠 10mg「ﾃﾊ」錠 点滴開始15分以上前に内服 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚﾅﾃｯｸｽ錠 4mg … 5錠 点滴開始15分以上前に内服	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚﾅﾃｯｸｽ錠 4mg … 5錠 ｶｲﾌﾛｽ点滴開始30～4時間前に内服	■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚｽｷﾆｭｰﾛ錠 10mg … 5錠 ｶﾛﾅｰﾙ錠 500mg…1.5錠 ﾌｧﾓﾃｼﾞﾝOD錠 10mg「ﾃﾊ」錠 点滴開始15分以上前に内服 外来化学療法関連院内渡し分 ﾚﾅﾃｯｸｽ錠 4mg … 5錠 点滴開始15分以上前に内服	
		■---【注射】 生理食塩液 250mL…1袋 ﾒｲﾝﾙｰﾄ ｻｰｸﾘｻとともに終了 生理食塩液 50mL…1瓶 ｻｰｸﾘｻ投与前のﾌﾗｲﾐﾝｸﾞ用 側管から ★★ｻｰｸﾘｻ点滴静注【化療】 生理食塩液　mL用(希釈専用) ml/h 1時間点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 要専用ルート 側管から 生理食塩液 50mL…1瓶 ｻｰｸﾘｻ投与後のﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 側管から 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　50mL…1瓶 ｶｲﾌﾛｽ投与前のﾌﾗｲﾐﾝｸﾞ用 ｶｲﾌﾛｽ【化療】 注射用水 20mL …1管 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　100mL…1瓶 30分点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　50mL…1瓶 ｶｲﾌﾛｽ投与後のﾌﾗｯｼｭ用	■---【注射】 生理食塩液 250mL…1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾛｽ投与前 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　50mL…1瓶 ﾌﾗｲﾐﾝｸﾞ用 ｶｲﾌﾛｽ【化療】 注射用水 20mL …1管 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　100mL…1瓶 30分点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　50mL…1瓶 フラッシュ用 生理食塩液 250mL…1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾛｽ投与後	■---【注射】 生理食塩液 250mL…1袋 ﾒｲﾝﾙｰﾄ ｻｰｸﾘｻとともに終了 生理食塩液 50mL…1瓶 ｻｰｸﾘｻ投与前のﾌﾗｲﾐﾝｸﾞ用 側管から ★★ｻｰｸﾘｻ点滴静注【化療】 生理食塩液　mL用(希釈専用) ml/h 1時間点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 要専用ルート 側管から 生理食塩液 50mL…1瓶 ｻｰｸﾘｻ投与後のﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 側管から 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　50mL…1瓶 ｶｲﾌﾛｽ投与前のﾌﾗｲﾐﾝｸﾞ用 ｶｲﾌﾛｽ【化療】 注射用水PL「ﾌｿｰ」100mL…1瓶 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　100mL…1瓶 30分点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　50mL…1瓶 ｶｲﾌﾛｽ投与後のﾌﾗｯｼｭ用	■---【注射】 生理食塩液 250mL…1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾛｽ投与前 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　50mL…1瓶 ﾌﾗｲﾐﾝｸﾞ用 ｶｲﾌﾛｽ【化療】 注射用水PL「ﾌｿｰ」100mL…1瓶 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　100mL…1瓶 30分点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　50mL…1瓶 フラッシュ用 生理食塩液 250mL…1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾛｽ投与後	■---【注射】 生理食塩液 250mL…1袋 ﾒｲﾝﾙｰﾄ ｻｰｸﾘｻとともに終了 生理食塩液 50mL…1瓶 ｻｰｸﾘｻ投与前のﾌﾗｲﾐﾝｸﾞ用 側管から ★★ｻｰｸﾘｻ点滴静注【化療】 生理食塩液　mL用(希釈専用) ml/h 1時間点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 要専用ルート 側管から 生理食塩液 50mL…1瓶 ｻｰｸﾘｻ投与後のﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 側管から 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　50mL…1瓶 ｶｲﾌﾛｽ投与前のﾌﾗｲﾐﾝｸﾞ用 ｶｲﾌﾛｽ【化療】 注射用水PL「ﾌｿｰ」100mL…1瓶 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　100mL…1瓶 30分点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　50mL…1瓶 ｶｲﾌﾛｽ投与後のﾌﾗｯｼｭ用	■---【注射】 生理食塩液 250mL…1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾛｽ投与前 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　50mL…1瓶 ﾌﾗｲﾐﾝｸﾞ用 ｶｲﾌﾛｽ【化療】 注射用水PL「ﾌｿｰ」100mL…1瓶 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　100mL…1瓶 30分点滴 5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖液　50mL…1瓶 フラッシュ用 生理食塩液 250mL…1袋 1時間点滴 ｶｲﾌﾛｽ投与後	■---【注射】 生理食塩液 250mL…1袋 ﾒｲﾝﾙｰﾄで点滴終了まで 生理食塩液 50mL…1瓶 ｻｰｸﾘｻ投与前のﾌﾗｲﾐﾝｸﾞ用 側管から ★★ｻｰｸﾘｻ点滴静注【化療】 生理食塩液　mL用(希釈専用) ml/h 1時間点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 ml/h 30分点滴 要専用ルート 側管から 生理食塩液 50mL…1瓶 ｻｰｸﾘｻ投与後のﾌﾗｯｼｭ用 全開で点滴可 側管から	
								■---【投薬】 ﾚﾅﾃｯｸｽ錠 4mg … 5錠 1日朝 食後 day23の朝食後に内服してください。 （　　月　　日） 1日	
Isa:10mg/kg d1,8,15,22（点滴時間は添付文書の規定に従う） KYP:20mg/㎡ d1,2　56mg/㎡ d8,9,15,16 Dex:40mg/body d1,2,8,9,15,16,22,23									