nonPhALL MRD2019(A)(36～55y.o.)

| | | Day1 | Day2 | Day3 | Day8 | Day9 | Day11 | Day13 | Day15 | Day16 | Day18 | Day20 | Day22 | クール終了日<br>Day28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗がん剤 | 注射・内服・処置 | ■----【注射】<br><br>ﾊﾛｷｻﾋﾁﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg「ﾀｲﾎｳ」…1袋<br>30分点滴<br><br>静脈内注射<br>ｵﾝﾀﾞﾝｾﾝ【化療】<br>生理食塩液 20mL … 1管<br>ゆっくり<br>側 … 1管から<br><br>ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ【化療】<br>生理食塩液 100mL…1瓶<br>30分点滴<br><br>ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ注【化療】<br>生理食塩液 250mL…1袋<br>1時間点滴<br><br>生理食塩液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | ■----【注射】<br><br>生理食塩液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ【化療】<br>生理食塩液 100mL…1瓶<br>30分点滴<br><br>生理食塩液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | ■----【注射】<br><br>生理食塩液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>ﾀﾞｳﾉﾏｲｼﾝ【化療】<br>生理食塩液 100mL…1瓶<br>30分点滴<br><br>生理食塩液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | ■----【注射】<br><br>生理食塩液 50mL…1瓶<br>ﾙｰﾄ確保用<br><br>静脈内注射<br>ｵﾝﾀﾞﾝｾﾝ【化療】<br>生理食塩液 20mL … 1管<br>ゆっくり<br>側 … 1管から | ■----【注射】<br><br>皮内注射<br>注射用水 20mL … 1管<br>生理食塩液 20mL … 1管<br>初回皮内反応試験用<br><br>5% ﾌﾄﾞｳ糖液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>★★ﾛｲﾅｰｾﾞ【化療】[静注用]<br>注射用水 20mL … 1管<br>5% ﾌﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｧｰﾏ」 500mL…1袋<br>(4)時間点滴<br><br>5% ﾌﾄﾞｳ糖液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | ■----【注射】<br><br>5% ﾌﾄﾞｳ糖液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>★★ﾛｲﾅｰｾﾞ【化療】[静注用]<br>注射用水 20mL … 1管<br>5% ﾌﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｧｰﾏ」 500mL…1袋<br>(4)時間点滴<br><br>5% ﾌﾄﾞｳ糖液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | ■----【注射】<br><br>5% ﾌﾄﾞｳ糖液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>★★ﾛｲﾅｰｾﾞ【化療】[静注用]<br>注射用水 20mL … 1管<br>5% ﾌﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｧｰﾏ」 500mL…1袋<br>(4)時間点滴<br><br>5% ﾌﾄﾞｳ糖液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | ■----【注射】<br><br>生理食塩液 50mL…1瓶<br>ﾙｰﾄ確保用<br><br>静脈内注射<br>ｵﾝﾀﾞﾝｾﾝ【化療】<br>生理食塩液 20mL … 1管<br>ゆっくり<br>側 … 1管から | ■----【注射】<br><br>5% ﾌﾄﾞｳ糖液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>★★ﾛｲﾅｰｾﾞ【化療】[静注用]<br>注射用水 20mL … 1管<br>5% ﾌﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｧｰﾏ」 500mL…1袋<br>(4)時間点滴<br><br>5% ﾌﾄﾞｳ糖液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | ■----【注射】<br><br>5% ﾌﾄﾞｳ糖液 50mL…1瓶<br>プライミング用<br><br>★★ﾛｲﾅｰｾﾞ【化療】[静注用]<br>注射用水 20mL … 1管<br>5% ﾌﾄﾞｳ糖注ﾊﾞｯｸﾞ「ﾌｧｰﾏ」 500mL…1袋<br>(4)時間点滴<br><br>5% ﾌﾄﾞｳ糖液 50mL…1瓶<br>フラッシュ用<br>全開で点滴可 | ■----【注射】<br><br>生理食塩液 50mL…1瓶<br>ﾙｰﾄ確保用<br><br>静脈内注射<br>ｵﾝﾀﾞﾝｾﾝ【化療】<br>生理食塩液 20mL … 1管<br>ゆっくり<br>側 … 1管から | |
| | | ■----【投薬】<br>ｱﾌﾚﾋﾞﾀﾝﾄｶﾌｪﾙ 125mg「ｻﾜｲ」…1C<br>抗がん剤開始60分前に内服してください。<br>1日<br><br>【5mg】ﾌﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠「ﾀｶﾀﾞ【化療 】<br>朝 食後<br>治療開始1日目から21日目まで内服してください。<br>(　月　日)～(　月　日)<br>21日 | ■----【投薬】<br>ｱﾌﾚﾋﾞﾀﾝﾄｶﾌﾟｾﾙ 80mg「ｻﾜｲ」…1C<br>1日朝 食後<br>治療開始翌日から2日間内服してください。<br>2日 | | | | | | | | | | ■----【投薬】<br>【5mg】ﾌﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠「ﾀｶﾀﾞ」 … 4錠<br>1日朝 食後<br>治療開始から22日目と23日目に内服してください。<br>(　月　日)(　月　日)<br>2日<br>【5mg】ﾌﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠「ﾀｶﾀﾞ」 … 2錠<br>1日朝 食後<br>治療開始から24日目と25日目に内服してください。<br>(　月　日)(　月　日)<br>2日<br>【5mg】ﾌﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠「ﾀｶﾀﾞ」…1錠<br>1日朝 食後<br>治療開始26日目、27日目、28日目に内服してください。<br>(　月　日)(　月　日)(　月　日)<br>3日 | |

VCR:1.3mg/㎡(max2mg) d1,8,15,22
DNR:50mg/㎡ d1,2,3
CPA:1000mg/㎡ d1
L-ASP:3000U/㎡ d9,11,13,16,18,20
PSL:60mg/㎡ d1-21(以後漸減)