

		Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	ケル終了日 Day28	
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>ハロ/セロ点滴静注バッグ0.75mg/5ml×1袋 30分点滴</p> <p>静脈内注射 カルゴチフ注射用 100mg×1瓶 生理食塩液 20mL×1管 シタレブ投与前に</p> <p>シタレブ【化療】 生理食塩液 500mL×1袋 (3)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL×1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p> <p>■---【投薬】</p> <p>フルドロ点眼液 (0.1%) 5mL/本 1日(4)回 両眼に点眼 治療開始1日目から5日目まで点眼してください。</p> <p>アラビシタカアセル 125mg/サワイ×1C 抗がん剤開始60分前に内服してください。 1日</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL×1瓶 プライミング用</p> <p>ハントロ【化療】 生理食塩液 100mL×1瓶 30分点滴</p> <p>静脈内注射 カルゴチフ注射用 100mg×1瓶 生理食塩液 20mL×1管 シタレブ投与前に</p> <p>シタレブ【化療】 生理食塩液 500mL×1袋 (3)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL×1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p> <p>■---【投薬】</p> <p>アラビシタカアセル 80mg/サワイ×1C 朝食後 抗がん剤開始翌日から2日間内服してく ださい。 2日</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL×1瓶 プライミング用</p> <p>ハントロ【化療】 生理食塩液 100mL×1瓶 30分点滴</p> <p>静脈内注射 カルゴチフ注射用 100mg×1瓶 生理食塩液 20mL×1管 シタレブ投与前に</p> <p>シタレブ【化療】 生理食塩液 500mL×1袋 (3)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL×1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL×1瓶 プライミング用</p> <p>静脈内注射 カルゴチフ注射用 100mg×1瓶 生理食塩液 20mL×1管 シタレブ投与前に</p> <p>シタレブ【化療】 生理食塩液 500mL×1袋 (3)時間点滴</p> <p>生理食塩液 50mL×1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>	<p>■---【注射】</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL×1瓶 プライミング用</p> <p>静脈内注射 カルゴチフ注射用 100mg×1瓶 生理食塩液 20mL×1管 Bイナセ投与前に</p> <p>★★Bイナセ【化療】静注用 注射用水 20mL×1管 5%ブドウ糖注バッグ「ア」 500mL×1袋 (4)時間点滴</p> <p>5%ブドウ糖液 50mL×1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p>		
		<p>MIT:10mg/m² d2,3 Ara-C:2000mg/m² d1-4 L-ASP:6000U/m² d5 MIT(T):15mg/body d1</p>						