

		ケール終了日	
		Day1	
		Day28	
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 100mL…1瓶 メインルートで投与終了まで</p> <p>静脈内注射 オンコピン【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 ゆっくり 側管より</p> <p>静脈内注射 プレドニ注【化療】 生理食塩液 20mL … 1管 側管から ロイナーゼの前に ゆっくり</p> <p>筋注 ★★ロイナーゼ【化療】[筋注用] 5%ブドウ糖液 20ml … 1管 ゆっくり</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>(C)ロイケリン散(100mg/g)【化療】 就寝前 連日内服してください。 28日</p> <p>(C)メトレキサート錠 2.5mg【化療】 1日就寝前 週1日、指定の日に内服してください。 (月日)(月日)(月日)(月日) 4日</p> <p>【5mg】プレドニゾン錠「タダ」【化療】 朝食後 注射した翌日の朝食後から4日間内服してください。 4日</p>	
<p>6MP:40mg/m² d1-28 MTX:20mg/m² d1,8,15,22 PSL:60mg/m² (Max100mg) d1(iv),d2-5(po) VCR:1.3mg/m² (Max2mg) d1 L-ASP:6000U/m² d1</p>			