

dd-EC(2週)

| | | | クール終了日 |
|---|----------|--|--------|
| | | Day1 | Day14 |
| 抗がん剤 | 注射・内服・処置 | <p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 1瓶 (30)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 エピルビン塩酸塩注射用【化療】 デキサト注射液 3.3mg … 1管 全開で点滴可 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 エトキシカン注【化療】 (30)分点滴 側管より</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可</p> | |
| | | <p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 アプレピタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C</p> | |
| | | <p>■---【投薬】</p> <p>アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日 朝食後 EC療法点滴の翌日から2日間内服してください。</p> <p>デキサメタゾン錠 0.5mg … 8錠 1日2回 朝・昼 食後 EC療法点滴の翌日から4日間内服してください。</p> | |
| EPI:90mg/m ² d1 CPA:600mg/m ² d1 | | | |