

CMF

				クール終了日
		Day1	Day8	Day28
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」… 1袋 デキサート注射液 3.3mg … 1管 (30)分点滴 メトトレキサート注(50mg用)【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 (30)分点滴 生理食塩液 100mL … 1瓶 フルオロウラシル注【化療】 (30)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	■---【注射】 グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」… 1袋 デキサート注射液 3.3mg … 1管 (30)分点滴 メトトレキサート注(50mg用)【化療】 生理食塩液 100mL … 1瓶 (30)分点滴 生理食塩液 100mL … 1瓶 フルオロウラシル注【化療】 (30)分点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可	
		■---【投薬】 (C)エトキシサン錠 50mg【化療】 1日 夕 食後 点滴をした日から服用して下さい。 14日間服用して14日間休薬します。		
MTX:40mg/㎡ d1,8 5-FU:500mg/㎡ d1,8 CPA:100mg/㎡(内服) d1-14				