

FOLFOX(食道がん)

| | | クール終了日 | |
|---|----------|---|--|
| | | Day1 | |
| | | Day14 | |
| 抗がん剤 | 注射・内服・処置 | <p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL…1管 プライミング用</p> <p>パロセトン点滴静注バッグ0.75mg「タイホウ」…1袋 デキサト注射液 6.6mg…1瓶 フアモチン静注 20mg「日新」 20mL…1管 ホララミン注 5mg…1管 (30)分点滴</p> <p>5%ブドウ糖 250mL…1袋 オキサリプラチン【化療】 (2)時間点滴 レホホリナートと同時滴下</p> <p>5%ブドウ糖 250mL…1袋 レホホリナート【化療】 (2)時間点滴 オキサリプラチンと同時滴下</p> <p>生理食塩液 50mL…1瓶 フルオウラシル注【化療】 全開で点滴可</p> <p>フルオウラシル注【化療】インフューサ[®]SV2.5用 生食 mL用(充填用) (46)時間点滴 携帯型ディスプレイサ[®]ブル注入ポンプ…1個</p> <p>ヘパリンNaロック用シリンジ 10mL(100単位)…1筒 全開で点滴可 フラッシュ用</p> | |
| | | <p>■---【投薬】</p> <p>デカ[®]ロン錠 0.5mg … 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴開始翌日から3日間飲んでください。</p> | |
| <p>L-OHP:85mg/m² d1 I-LV:200mg/m² d1 5-FU:400mg/m² d1(急速静注), 2400mg/m² d1(持続静注)</p> | | | |