

FOLFOX(食道がん)

			クール終了日
		Day1	Day14
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL…1管 プライミング用</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg「タイホウ」…1袋 デキサト注射液 6.6mg…1瓶 ファミジン静注 20mg「日新」 20mL…1管 ホラミン注 5mg…1管 (30)分点滴</p> <p>5%ブドウ糖 250mL…1袋 オキサリプラチン【化療】 (2)時間点滴 レボホリナートと同時滴下</p> <p>5%ブドウ糖 250mL…1袋 レボホリナート【化療】 (2)時間点滴 オキサリプラチンと同時滴下</p> <p>生理食塩液 50mL…1瓶 フルオロウラシル注【化療】 全開で点滴可</p> <p>フルオロウラシル注【化療】インフューザSV2.5用 生食 mL用(充填用) (46)時間点滴 携帯型ディスプレイサプルの注入ポンプ…1個</p> <p>ヘパリンNaロック用シリンジ 10mL(100単位)…1筒 全開で点滴可 フラッシュ用</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>デキロン錠 0.5mg … 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴開始翌日から3日間飲んでください。</p>	
<p>L-OHP:85mg/m<sup>2</sup> d1 I-LV:200mg/m<sup>2</sup> d1 5-FU:400mg/m<sup>2</sup> d1(急速静注), 2400mg/m<sup>2</sup> d1(持続静注)</p>			