

FOLFOX+RT(食道がん)

		クール終了日
		Day1
		Day14
抗がん剤	注射・内服・処置	■---【注射】 生理食塩液 20mL…1管 プライミング用 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg「タイホウ」…1袋 デキサート注射液 6.6mg…1瓶 ファモチジン静注 20mg「日新」 20mL…1管 ホララミン注 5mg…1管 (30)分点滴 5% フドウ糖 250mL…1袋 オキサリプラチン【化療】 (2)時間点滴 レボホリナートと同時滴下 5% フドウ糖 250mL…1袋 レボホリナート【化療】 (2)時間点滴 オキサリプラチンと同時滴下 生理食塩液 50mL…1瓶 フルオロウラシル注【化療】 全開で点滴可 フルオロウラシル注【化療】インフューザSV2.5用 生食 mL用(充填用) (46)時間点滴 携帯型ディスプレイサンプ注入ポンプ…1個 ヘパリンNaロック用シリンジ 10mL(100単位)…1筒 全開で点滴可 フラッシュ用
		■---【投薬】 デカトロン錠 0.5mg … 4錠 1日2回 朝・昼 食後 抗がん剤点滴開始翌日から3日間飲んでください。
L-OHP:85mg/m ² d1 I-LV:200mg/m ² d1 5-FU:400mg/m ² d1(急速静注), 1600mg/m ² d1(持続静注)		