

			クール終了日
		Day1	Day14
抗がん剤	注射・内服・処置	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL … 1管 プライミング用</p> <p>アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg … 1袋 デキサト注射液 6.6mg … 1瓶 デキサト注射液 3.3mg … 1管 フアモチン静注 20mg「日新」 20mL … 1管 ホララミン注 5mg … 1管</p> <p>5% フドウ糖液 250mL … 1瓶 オキサリプラチン【化療】 (2)時間点滴</p> <p>5% フドウ糖液 250mL … 1瓶 レボホリナート【化療】 (2)時間点滴 イリノテカンと同時滴下</p> <p>5% フドウ糖液 250mL … 1瓶 イリノテカン【化療】 (2)時間点滴 レボホリナートと同時滴下</p> <p>生理食塩液 50mL … 1瓶 フルオロウラシル注【化療】 全開で点滴可</p> <p>フルオロウラシル注【化療】インフューザSV2.5用 生食 mL用(充填用) … 100mL (46)時間点滴</p> <p>ロック用生食注シリンジ 10mL … 1筒 フラッシュ用</p>	
		<p>■---【処置】</p> <p>外来化学療法関連院内渡し分 アプレヒタントカプセル 125mg「サワイ」 … 1C 抗癌剤点滴1時間～1.5時間前に内服してください。</p>	
		<p>■---【投薬】</p> <p>アプレヒタントカプセル 80mg「サワイ」 … 1C 1日 朝食後 抗癌剤点滴翌日から2日間内服してください。</p>	
<p>L-OHP:85mg/m<sup>2</sup> d1 I-LV:200mg/m<sup>2</sup> d1 IRI:180mg/m<sup>2</sup> d1 5-FU(bolus):400mg/m<sup>2</sup> d1 5-FU(infusion):2400mg/m<sup>2</sup> d1</p>			