Aza皮下注+Ven(#1)

			·			·		休薬期間
	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	Day28
亢がん剤 注射・内服・処置	■――[注射] 皮下注 アンデッテン注射用【化療】: 皮下 注射用水 20mL・・・・1管 調製後 1時間 以内に 投与終 アすること 調製時 26mlを超える場合は、シリン・2本 使用し均等に分けること	皮下注 アサジチン注射用【化療】: 皮下 注射用水 20mL ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	注射用水 20mL・・・・1管 調製後:時間以内に投与終了すること 調製時26mと超える場合は、シリンジ2本 使用し均等に分けること	皮下注 アサッチジン注射用(化療]:皮下 注射用水 20mL・・・1管 調製後 時間以内に投与終了すること 調製機2.6mLを超える場合は、シリンジ2本 使用し均等に分けること	■[注射] 皮下注 アザンデン注射用【化療】: 皮下 注射用水 20mL・・・・「管 調製後時間以内に投与終了すること 調製時息の配を超える場合は、シリンジ2本 使用し均等に分けること	皮下注 アザッチッン注射用【化療】: 皮下 注射用水 20mL・・・1管 調製機 時間以内に投与終了すること 調製制度2.6m上起える場合は、シリンジ2本 使用し均等に分けること	■[注射] 皮下注 アザンテン注射用【化療】: 皮下 注射用水 20mL・・・「管 調製後時間以内に投与終了すること 調製時2.6mLを超える場合は、シリンジ2本 使用し均等に分けること	
		がラニセトロン内服セ"リー 2mg「ケミファ」 ··· 1包 ■【投薬】	グラニセトロン内服ゼリー 2mg「ケミファ」 ··· 1包 ■【投薬】		775-EF-ID-J内服ゼリー 2mg[f5:77] … 1包		ケテニセトロン内服セリー 2mg「ケミファ」 … 1包	
	1日目	1日 回 朝 及後 2日目 主治医の指示を確認後に内服してくださ い。 1日	3日目	4~28日目				

28日毎