

R-CHOP(2日で)

				休薬期間終了日
		Day1	Day2	Day21
		■---【処置】 外来化学療法関連院内渡し分 レスタミンコーワ錠 10mg … 5錠 ロキソプロフェンNa錠 60mg「武田テバ」… 1錠 リツキシマブ開始30分前に内服	■---【投薬】 【5mg】プレドニゾン錠「タケダ」… 1回 20錠 1日1回 朝食後 点滴の翌日から必ず4日間服用してください。 4日	
		■---【注射】 点滴 グーイーF輸液 500mL … 1袋 メインルートで点滴終了まで 点滴 リツキシマブBS注【治療】… ???mg 生理食塩液 mL用(希釈専用) … ??mL 25 ml/h (30)分点滴 50 ml/h (30)分点滴 以降、30分毎に(25)mL/hずつ上げる 最大200ml/hまで 側管より 点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 側管より	■---【注射】 点滴 グーイーF輸液 500mL … 1袋 (2)時間点滴 メインルートで点滴終了まで 点滴 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg「HK」… 1袋 プレドニン〔水溶性〕50mg … 2管 生理食塩液 5mL(溶解用) … 1管 (30)分点滴 側管より 静脈内注射 生理食塩液 20mL … 1管 オンコビン【治療】 ゆっくり 禁血管外漏出 側管より 点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 ドキシルビシン塩酸塩注【治療】 全開で点滴可 側管より 点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 ドキシルビシン投与後 側管より 点滴 生理食塩液 250mL … 1袋 エンドキサン注【治療】 (60)分点滴 側管より 点滴 生理食塩液 50mL … 1瓶 フラッシュ用 全開で点滴可 エンドキサン投与後 側管より	
抗がん剤	注射・内服・処置			
R: 375mg/m ² d1 VCR: 1.4mg/m ² : d2 DXR: 50mg/m ² d2 CPA: 750mg/m ² : d2 PSL: 100mg/body d2(iv), day3-6(po) 21日毎				